

www.syxyl.de

Ginkgo Syxyl Tabletten

Gebrauchsinformation

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Ginkgo Syxyl Tabletten

Wirkstoff: Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4; HAB Vorschrift 4a, 7

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Ginkgo Syxyl Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind oder wenn Sie Erfahrungen mit einer der aufgeführten Nebenwirkungen gemacht haben, die schwerwiegend sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was sind **Ginkgo Syxyl Tabletten** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Ginkgo Syxyl Tabletten** beachten?
3. Wie sind **Ginkgo Syxyl Tabletten** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind **Ginkgo Syxyl Tabletten** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen?

1. Was sind Ginkgo Syxyl Tabletten und wofür werden sie angewendet?

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis:

Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fortauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten beachten?

Ginkgo Syxyl Tabletten dürfen nicht bei Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen oder einen der sonstigen Bestandteile eingenommen werden.

Kinder unter 6 Jahren

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten sind erforderlich

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 6-12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollten Ginkgo Syxyl Tabletten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Ginkgo Syxyl Tabletten

Dieses Arzneimittel enthält Milchzucker (Lactose). Bitte nehmen Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an

der selten vorkommenden ererbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

3. Wie sind Ginkgo Syxyl Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungs-beilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 1 Tablette ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Ginkgo Syxyl Tabletten** zu stark oder zu schwach sind.

Wie lange sollten Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** einnehmen?

Allgemeiner Hinweis:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Ginkgo Syxyl Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten:

Über akute Vergiftungen durch **Ginkgo Syxyl Tabletten** sind beim Menschen bisher nicht berichtet worden. Setzen Sie bitte die Behandlung beim nächsten Einnahmezeitpunkt mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie die Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern setzen Sie die Einnahme von **Ginkgo Syxyl Tabletten** mit der üblichen Dosis fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können **Ginkgo Syxyl Tabletten** Nebenwirkungen haben.

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten

häufig: mehr als 1 von 100 Behandelten

Gelegentlich: mehr als 1 von 1000 Behandelten

Selten: mehr als 1 von 10.000 Behandelten

Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

4.1 Nebenwirkungen

Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen. In Einzelfällen können allergische Hautreaktionen auftreten.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist Ginkgo Syxyl Tabletten aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Bitte bewahren Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** stets in dem Umkarton und nicht über 25°C auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blisterstreifen angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

6. Weitere Informationen

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4100 mg

HAB Vorschrift 4a, 7

Sonstige Bestandteile:

Magnesiumstearat, Kartoffelstärke

Ginkgo Syxyl Tabletten ist in der Originalpackung zu 60 und 120 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Syxyl, Gereonsmühlengasse 5, 50670 Köln

Telefon: 0800/1652400 Telefax: 0800/1652700
E-Mail: dialog@syxyl-service.de

Hersteller und Mitvertreiber:

Artesan Pharma GmbH & Co.KG, Wendlandstr. 1, 29439 Lüchow
Telefon: 05841/9390, Telefax: 05841/939200

Stand der Information

J□i 2010

© 2012 Syxyl GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten